四庫全書

子部

普濟方卷二百五　　明　周王朱橚　撰

膈噎門

膈氣宿食不消附論

夫飲食入於胃而化於脾脾胃和調則水穀易腐若脾胃虛寒即傳化不時新陳藴積況膈氣之人氣道久澁是以噫氣酸臭否滿噎塞而若宿食不消也

麥蘖散　治膈氣宿食不消

麥蘖四兩炒 芎藭 白芷 蘹香子炒 烏藥各一兩半 莎草根炒去毛 桔梗炒 陳橘皮湯浸去白焙 縮砂去皮 紅豆 蓬莪茂炮 厚朴去粗皮生薑汁炙熟 人參各一兩 白朮三兩 桂去粗皮 訶黎勒皮半兩 木香二錢 蒼朮米泔水浸一宿麩炒三兩

右為散每服二錢陳米飲或鹽湯調下不計時候

厚朴湯 治腸氣宿食不消

厚朴去粗皮剉兩半生薑汁浸一宿炒 草豆蔻去皮 桂去粗皮

高良薑　五味子各半兩　青橘皮湯浸去白焙　人參

甘草炙　麥蘖炒　柴胡去苗　麻黄去根節煮掠去沫焙

陳麯炮　訶梨勒炮去核各一兩　益智炒去皮二兩　乾薑炮一分　烏頭炮製去皮臍二兩　陳橘皮湯浸去白焙一兩

右粗篩每服三錢以水一盞薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓稍熱服不計時候

人參茯苓湯　治膈氣宿食不消痰毒虚氣飲食無味壯熱增寒霍亂吐逆

人參二兩　赤茯苓去黑皮一兩半　訶梨勒皮　附子炮裂　去皮臍　黄耆　前胡去蘆頭　枇杷葉拭去毛　白朮　麻黄去根節　益智子去皮　陳橘皮　桂去粗皮　乾薑炮　甘草炙各一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服如脾泄氣痢及傷寒三日外要出汗併三服衣被蓋出汗不計陰陽一切食毒傷寒並能療之

蓽澄茄散　治膈氣壅滯脾胃虚弱宿食不消四肢虚乏

蓽澄茄一兩　草豆蔻半兩去皮　人參半兩去蘆頭　白朮三分　木香半兩　大腹皮三分剉　荊三稜半兩微煨剉　五味子半兩　細辛一兩　甘草半兩炙微赤剉　訶梨勒皮一兩　高良薑半兩剉　半夏半兩湯洗七遍去滑　青橘皮半兩湯浸去白瓤焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚同煎至六分去滓不計時候稍熱服

參麴散出聖濟總錄　治膈氣宿食不消氣攻兩脇痛口內

噎痰心胸不快

人參 白茯苓（去黑皮） 枳殼（去穰麸炒） 京三稜（煨熟）

桂（去粗皮） 木香 甘草（炙） 白朮 白檳榔（剉）

陳麯（炒黃） 訶梨勒皮 乾薑（炮） 厚朴（去粗皮生薑汁炙熟）

各三分

右為散每服二錢入鹽點服空心食前

厚朴散（出聖惠方） 治膈氣脾胃久冷宿食不消心腹虛脹四肢瘦弱宜服

厚朴一兩去粗皮薑汁炙 沉香三分 青橘皮湯浸二宿去白穰焙

檳榔半兩 丁香半兩 訶梨勒皮一兩半 桂心半兩

草豆蔻一兩去皮 白朮三分 人參三分去蘆頭 木香三分

高良薑三分剉 甘草一分炙微黃剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參湯出聖惠方 治膈氣壅滯不下飲食或宿食不消

人參一兩去蘆頭 木香半兩 檳榔半兩 乾薑三分炮裂剉

白术一兩 枳殼半兩麩炒微黃去瓤 桂心一兩 赤茯苓一兩

青橘皮三分湯浸去白焙 京三稜一兩微煨剉 甘草半兩炙微

赤剉 訶梨勒皮一兩 厚朴二兩去粗皮塗薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

草豆蔻散 治膈氣壅滯不下飲食或宿食不消

人參三分去皮 細辛半兩 赤茯苓半兩 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香熟 草豆蔻三分去蘆頭 青橘皮三分去白焙

訶梨勒皮一兩　益智子半兩去皮　半夏半兩湯浸七遍去滑

甘草一分炙微赤剉　丁香一分　檳榔三分

右散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服

訶梨勒湯出聖惠方　治膈氣脾胃積冷宿食不消心胸不利

訶梨勒皮一兩　人參三分去蘆頭　白朮三分　木香二分

黄耆三分剉　神麯一兩炒微黄　桂心三分　麥蘖三分炒微

黄 高良薑炒三分 草豆蔻去皮三分 陳橘皮湯浸去白穰焙半兩

右為細末不拘時候以生薑湯調下一錢

草豆蔻散 治膈氣宿食不消

草豆蔻去皮 高良薑炮 陳麯炒 木香各一兩 訶梨勒炮去核 陳橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 麥糵炒 烏梅肉炒 甘草炙各半兩

右為末每服二錢入鹽點服空心食前

建中湯出王氏博濟方　治膈氣宿食不消胸膈痞滿心腹脹痛陰陽不和臍腹撮痛

草豆蔻去皮　陳麯炒　麥糵炒　陳橘皮湯浸去白焙
白朮　厚朴去粗皮炙香熟　乾薑炮各一兩　蘹香子炒
木香各半兩

右粗擣篩每服三錢入生薑三片棗二枚擘破水一盞同煎至七分去滓温服不計時候一方為末入鹽煎湯下空心常服

磨脾湯出聖濟總録 治膈氣宿食不消溫脾胃除積冷

木香 人參 附子炮製去皮臍 赤茯苓去黑皮

甘草各二兩 乾薑炮 神麯炒 麥蘖炒

草豆蔻去皮各一兩

右為散每服二錢入鹽點服不計時候

木香散出聖惠方 治膈氣胸中不利宿食不化

木香一兩 桃仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒 草豆蔻一兩去皮

訶梨勒皮二兩 桂心一兩 檳榔一兩 白术三分

麥糵三分炒微黃　甘草一分微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候稍熱服

人參散　治胸膈氣滯脾胃虛冷飲食不消面無顔色

人參一兩去蘆頭　赤茯苓一兩　白术一兩　木香半兩

麥糵三分炒微黃　訶梨勒皮一兩　縮砂半兩去皮　附子一兩炮製去皮臍　吴茱萸一兩湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服不計時候以粥飲調下一錢

訶梨勒圓　治膈氣心胸妨悶不能下食食不消化

訶梨勒皮一兩半　檳榔一兩　桂心一兩　木香一兩

甘草半兩炙微赤剉　陳橘皮二兩湯浸去白焙　前胡一兩半去蘆頭

白朮一兩　五味子一兩

右為末以棗肉和擣三二百杵丸如梧桐子大每服

不計時候以生薑湯棗湯下三十丸

神麯丸出聖惠方　治膈氣不下食不能消化

神麯四兩炒微黄　麥蘖四兩炒微黄　厚朴二兩去粗皮生薑汁炙熟

桂心一兩 陳橘皮一兩半湯浸去白焙 檳榔一兩 乾薑一兩炮裂剉 訶梨勒皮一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候生薑湯下二十九

蘇湯煎 治膈中氣不快酒食不消飲食不快善治脾元一切虛中積滯

肉豆蔻 丁香 沉香 硇砂各一分 京三稜 蓬朮燒存性各一兩

右為末烏梅肉丸如麻子大每服十四粒空心熟紫蘇湯下

附子丸出聖濟總録 治膈氣宿食不消散寒邪温脾胃

丹砂研細如粉留一半末為衣 附子炮製去皮臍各一兩 檳榔剉碎半兩

杏仁二十八枚去皮尖雙仁另研膏 丁香一錢

右研極細和匀煉蜜為丸如梧桐子大丹砂為衣每服三丸至五丸先嚼棗二枚裹藥丸乾嚥後生薑湯下不計時候

養胃丸出聖濟總錄 治膈氣宿食不消

丁香半斤 白朮 人參各十一兩 厚朴去皮剉作小塊一斤

生薑五斤用自然汁於銀石器內同厚朴文武火煮盡薑汁炒令乾

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前服米飲下

硇砂丸出聖濟總錄 治膈氣宿食不消消滯進飲食

山芋 木香 肉豆蔻去皮 檳榔剉各半兩

硇砂一兩研碎以漿水一大盞化去沙泥熬盡漿水却入好酒半升重熬如膏

右為細末以硇砂膏搜和令匀却以好酒半盞煑麵糊為丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食後良久温酒下

膈氣妨悶 附論

夫膈氣妨悶者由憂恚思慮冷熱不調氣結胸中上下痞滿致飲食噎塞津液不通虛冷之氣攻迫咽喉故令妨悶也

大腹皮散 出聖惠方 治膈氣心胸壅滯妨悶

大腹皮剉　赤茯苓　白术　丁香　芎藭

陳橘皮湯浸去白穰焙　草豆蔻去皮　木香　厚朴去粗皮塗

生薑汁炙令香熟　人參去蘆頭　桂心以上各半兩　甘草一分

炙微赤剉

右麤擣篩為散每服三錢水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候稍熱服

白术散出聖惠方　治膈氣不散胸中噎塞不下食時妨悶

白术半兩　半夏一兩湯浸七遍去滑　赤茯苓一兩　大腹皮

一兩剉　人參三分　青橘皮三分湯浸去白瓤焙　枇杷葉一兩拭去毛炙微黄　木香半兩　前胡二兩去蘆頭　檳榔一兩　厚朴一兩去粗皮生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

檳榔散出聖惠方　治膈氣心胸妨悶不下飲食

檳榔三分　前胡一兩去蘆頭　桂心半兩　草豆蔻半兩去皮　郁李仁三分湯浸去皮炒　川大黄一兩剉碎微炒　木香三分

枳殼三分麩炒微黃去穰　乾薑半兩炮裂剉　甘草一分炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分不計時候稍熱服

紫蘇散出聖惠方　治膈氣胸中妨悶痰壅不下食

紫蘇葉二兩　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　半夏一兩湯洗七遍去滑

枳殼三分麩炒微黃去穰　柴胡二兩去苗　檳榔一兩　桂心一兩

赤茯苓一兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去渣不計時候稍熱服

枳殻丸（出聖惠方）　治膈氣脹滿喫食妨悶脚手疼煩漸加羸瘦四肢無力

枳殻（一兩麩炒微黄去瓤）　木香（一兩）　檳榔（一兩）　赤芍藥（一兩）　麥門冬（一兩半去心焙）　羚羊角屑（一兩）　前胡（二兩去蘆頭）　赤茯苓（二兩）

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥米飲下三十九

訶梨勒丸出聖惠方 治膈氣心腹妨悶不能下食

訶梨勒皮二兩 檳榔一兩 木香一兩 五味子一兩

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 川芒硝一兩

右為末以酒煑麪糊丸如梧桐子大不計時候煎薑

棗湯下二十丸

桃仁散出聖惠方 治膈氣心胸妨悶常欲嘔吐湯水不下

桑根白皮一兩剉 桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒黄 木香半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候稍熱服

膈氣心腹痞滿　附論

夫膈氣心腹痞滿者由寒氣在於胸膈逆滿咽喉噎塞不通噫聞食臭心腹脹滿此皆榮衛不和隂陽隔絶藏腑否澁壅而不宣通故令心腹痞滿也

方

訶梨勒散　出聖惠方　治膈氣心腹痞滿胃氣虛弱不能飲食

訶梨勒皮一兩 人參三分去蘆頭 京三稜三分微炮剉

草豆蔻一兩去皮 陳橘皮一兩湯浸去白瓤 甘草半兩炙微赤剉

白术三分 赤茯苓三分 檳榔三分 乾薑三分炮裂剉

桂心三分

右為細末每服不計時候煎生薑橘皮湯調下一錢

白朮散出聖惠方 治氣膈心腹痞滿四肢拘急體重

白朮三分 木香半兩 訶梨勒皮三分 甘草一分炙微赤剉

桂心三分 丁香半兩 人參半兩去蘆頭 厚朴一兩薑汁炙

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　草豆蔻一兩去皮

右為細末每服不計時候煎生薑木瓜湯調下一錢

柴胡散出聖惠方　治氣膈心腹痞滿不下飲食肩背壅悶四肢煩疼

柴胡二兩去苗　枳殼一兩麩炒微黃　白朮一兩　檳榔二兩

甘草半兩炙微赤剉　赤茯苓二兩　陳橘皮二兩湯浸去白穰焙

赤芍藥一兩　訶梨勒皮二兩

右為粗散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候稍熱服

赤茯苓丸（出聖惠方）治氣膈咽喉噎塞心腹痞滿不下飲

食胸背俱悶

赤茯苓（一兩）　桂心（一兩）　乾薑（三分炮製剉）　檳榔（一兩）

甘草（半兩炙微赤剉）　陳橘皮（一兩湯浸去白）　訶梨勒皮（二兩半）

枳殼（一兩麩炒微黃）　羚羊角屑（一兩）

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服一丸

不計時候常含一丸嚥津如患甚即將一丸煎湯研

破服亦得

沉香丸（出聖惠方） 治氣膈脾胃久冷心腹痞滿喫食無味面色痿黄

沉香（半兩） 丁香（半兩） 木香（半兩） 檳榔（半兩） 桂心（一兩） 訶梨勒皮（一兩） 川大黄（半兩剉碎微炒） 肉豆蔻（半兩去殻） 麝香（一分細研）

右為末入麝香研令匀煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯嚼下十九

人參丸 出聖惠方 治氣膈心腹痞滿不下飲食或時嘔吐四肢不和

人參二兩去蘆頭 桂心一兩 赤茯苓一兩 檳榔一兩 訶梨勒皮一兩 甘草一分炙微赤剉 陳橘皮一兩湯浸去白焙 乾薑半兩炮裂剉

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候薑湯下三十丸

枇杷葉散 出聖惠方 治氣膈吐涎痰食不消化心腹痞滿

雷鳴

枇杷葉一兩拭去毛炙微黄 人參一兩去蘆頭 桔梗一兩去蘆頭

檳榔半兩 半夏一兩湯浸七遍去滑 陳橘皮二兩湯浸去白瓤焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治久患氣膈心腹痞滿咽喉噎塞不下飲食宜服此方

枳殼一兩麩炒微黄去瓤 訶梨勒皮一兩半

右為散每服不計時候煎生橘皮湯調下一錢

蓽撥飲出聖濟總録 治膈氣心腹痞滿全不思食

蓽撥 沉香剉 草豆蔻去皮 丁香 桃仁炒去皮尖

青橘皮去白焙 大腹子剉 生薑切炒各一兩 甘草剉炙 枳殼去瓤麩炒各半兩 訶梨勒皮二兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不計時候

黑丸子出楊氏家藏方 治胸膈痞塞心腹堅腹脹氣積氣塊及大小便不通

黒牽牛　天門冬去心各等分生用

右為末滴水和丸如梧桐子大每服五十丸温熟水送下

六君子湯出楊氏家藏方　治胸膈痞滿脾塞不嗜食服燥藥不得者正宜服

枳殼去穰麩炒　人參去蘆頭　陳橘皮去白　白朮

白茯苓去皮　半夏湯洗七遍切作片子

右各等分為粗末每服五錢水二鍾生薑五片同煎

至半盞去滓溫服不拘時候

丁香丸（出楊氏家藏方） 治胸膈痞滿嘔逆惡心腹脇脹滿

丁香（二兩） 沉香（一兩） 人參（去蘆頭） 肉豆蔻（十四枚麵裹煨）熟

右為細末用甘草十兩搥碎入水一斗揉盡去滓熬成膏子為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不拘時候

膈氣心胸中痛 附論

夫膈氣心胸中痛者由宿食寒氣在於臟腑之間因其經絡否澁不得宣通臟虛邪盛上攻於胸中邪氣與正氣相擊故令心胸中痛也

方

木香丸出聖惠方 治膈氣心胸氣滯疼痛連於腹脇飲食不下

木香一兩　青橘皮一兩去白穰焙　檳榔一兩　桂心一兩

乾薑半兩炮製剉　人參三分去蘆頭　細辛三分　吳茱萸

湯浸焙炒 川烏頭半兩炮製去皮臍 貝母三分去心

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸常含三五丸嚥津甚佳

赤茯苓散出聖惠方 治膈氣壅滯攻心胸中連肩背痛日夜不止

赤茯苓一兩 桂心一兩 人參一兩去蘆頭 白术一兩

陳橘皮二兩湯浸去白穰焙 蓬莪术一兩 大黃一兩剉碎微炒

吴茱萸一兩湯浸焙乾 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香熟

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

丁香散（出聖惠方） 治膈氣心胸冷氣疼痛不食少力

丁香（半兩） 厚朴（一兩去粗皮薑汁炙） 桂心（三分） 白朮（一兩）

甘草（半兩炙微赤剉） 人參（一兩去蘆頭） 赤芍藥（半兩）

右為粗散每服四錢水一中盞煎至五分去滓入酒半小盞更煎至三兩沸不計時候稍熱服

檳榔散（出聖惠方） 治膈氣心胸冷硬結痛下氣

檳榔二兩　木香一兩　陳橘皮一兩半湯浸去白焙　枳實一兩麩炒微黃　前胡一兩去蘆　川大黃二兩剉碎微炒

右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

下

桂心散出聖惠方　治膈氣心胸中伏滯冷氣疼痛飲食不下

桂心一兩　前胡一兩去蘆頭　人參一兩去蘆頭　牛蒡根一兩剉　訶梨勒皮二兩　青橘皮一兩湯浸去白穰焙

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

柴胡散出聖惠方 治膈氣心胸中煩滿疼痛及走疰氣欲絶

柴胡一兩去蘆頭 甘草半兩炙微赤剉 當歸三分剉微炒

木香一兩 檳榔一兩 犀角屑一兩 麝香三分細研

右為散入麝香研匀每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

小草丸出聖惠方 治膈氣心胸間痛氣逆飲食不下

小草三分 桂心三分 細辛三分 附子半兩炮製去皮臍

川椒三分去目閉口者微炒出汗 乾薑三分炮製剉

右為末煉蜜和擣三二百杵為丸每服不計時候以粥飲下三十丸

半夏散出聖惠方 治膈氣心胸中積冷氣痛心中滿悶不能下食或嘔吐

半夏一兩湯浸七遍去滑 吴茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒 桂心一兩

人參一兩去蘆頭　甘草半兩炙微赤剉

右為末每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不計時候稍熱服

厚朴散出聖惠方　治膈氣心胸中虛寒疼痛

厚朴二兩去粗皮塗薑汁炙　吳茱萸一兩湯浸七遍焙乾炒

桂心一兩　白朮一兩　陳橘皮一兩半湯浸去白瓤焙

右為細散每服不計時候熱酒送下一錢

木香散出聖惠方　治膈氣心胸中氣痛不可忍

木香半兩　吴茱萸一兩湯浸七遍焙乾微炒　桂心三分

右為細散每服二錢以水一中盞煎至六分和滓不計時候稍熱服

白朮散出聖惠方　治膈氣心胸間痛宜服

白朮一兩　枳實一兩麸炒微黄　神麴一兩炒微黄

右為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

乾薑散出聖惠方　治膈氣食後嘔逆心胸中疞痛

乾薑半兩炮製剉　吴茱萸半兩湯浸七遍焙乾　白朮二兩

右為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

枳實散出聖惠方　治膈氣心胸氣逆時復疼痛

枳實一兩麩炒微黃　桂心一兩

右為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

前胡湯出千金方　治胸中久寒澼實膈塞胸痛氣不通利三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重卧不欲起

前胡　人參　甘草　當歸　半夏各二兩　大黃

防風　麥門冬　吳茱萸　黄芩各一兩　生薑四兩

杏仁四十枚

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服深師方云若脇下滿加大棗十二枚煎服忌生冷海藻菘菜羊肉餳

膈氣嘔吐酸水

夫五膈氣嘔吐酸水者胸中氣滞胃有宿飲冷水停積乘於脾胃脾得水濕則不能消化水穀故令氣逆脹滿

嘔吐酸水也

方

丁香散出聖惠方治五膈氣脾胃虛冷嘔吐酸水不能下食四肢乏力

丁香半兩　白朮三分　桂心一兩　陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙

半夏半兩湯浸七遍去滑　枳殼半兩麩炒微黃　人參三分去蘆頭

藿香半兩　赤茯苓三分　乾薑半兩炮裂剉　訶梨勒皮一兩　甘草一分炙微赤剉　厚朴一兩半塗薑汁炙令香熟去粗皮

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

訶梨勒皮散 出聖惠方 治五膈氣胸中噎塞嘔吐酸水不能下食

訶梨勒皮一兩 雞舌香半兩 陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

白豆蔻半兩去皮 人參半兩去蘆頭 白朮三分 桂心一兩

赤茯苓半兩 前胡三分去蘆頭 甘草一分炙微赤剉

高良薑一兩剉 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香

右為散每服不計時候以陳米粥飲調下二錢

草豆蔻丸出聖惠方 治五膈脾胃久冷嘔吐酸水臍腹疞痛不思飲食

草豆蔻一兩去皮 附子一兩炮製去皮臍 縮砂一兩去皮

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 乾薑半兩炮製剉 枳實半兩麸炒微黄

吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾 桂心三分 檳榔半兩 木香半兩

雞舌香半兩 當歸半兩炙微赤剉

右為末水浸蒸餅和擣三二百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以熱酒下三十九

白朮散聖惠方 治五膈氣嘔吐酸水寒氣上攻於胸中刺痛腹脇脹滿飲食不下

白朮一兩 木香半兩 吴茱萸半兩湯浸七遍焙乾 桂心一兩 陳橘皮一兩去白穰焙 蓽撥半兩 檳榔一兩 川大黄一兩微炙 人參一兩去蘆頭 厚朴一兩半去粗皮塗薑汁炙令香赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

半夏散出聖惠方 治五膈氣嘔吐酸水脾胃虚寒不能下食

半夏半兩湯浸七遍去滑 檳榔半兩 紅豆蔻半兩去皮 桂心三分 木香半兩 白朮三分 陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙 赤茯苓三分 當歸半兩炒微黄剉 高良薑半兩剉

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

赤茯苓丸出聖惠方 治五膈氣滯宿食不消嘔吐酸水腹

脹不能下食

赤茯苓一兩 陳橘皮二兩湯浸去白 大麥糵一兩炒微黄

桂心一兩 乾薑一兩炮裂剉 人參一兩去蘆頭 木香一兩

神麯二兩炒微黄 訶梨勒皮二兩 甘草半兩炙微赤剉

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候薑湯下三十丸

木香散出聖惠方 治五膈氣脾胃虛冷食不消化嘔吐酸水四肢不和面色青黃漸加羸弱

木香半兩　陳橘皮一兩湯浸去白焙　蓽撥半兩　桂心半兩
乾薑半兩炮裂剉　訶梨勒皮一兩　附子一兩炮裂去皮臍
大腹皮三分　甘草一分炙微赤剉
右為細散每服不計時候以熱酒下一錢

檳榔散出聖惠方　治膈氣脾胃寒不能食嘔吐酸水時復
胸膈刺痛
檳榔二兩　人參一兩去蘆　白朮一兩　白豆蔻一兩去殼
陳橘皮一兩湯浸去白　半夏三分湯洗七遍　高良薑一兩剉

蓽撥一兩　厚朴二兩去粗皮塗薑汁炙令香熟

右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

木香散　治五膈氣及胃口不和多吐酸水不思飲食

木香半兩　人參三分去蘆　附子三分炮製去皮臍　丁香半兩

乾薑半兩炮製剉　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　訶梨勒皮一兩

草豆蔻一兩去皮　射干半兩

右為散每服不計時候煎生薑棗湯調下二錢

厚朴散 出聖惠方 治五膈氣心胸久冷結滯時多嘔吐酸水不思飲食

厚朴 一兩半去粗皮薑汁炙令香 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾炒

人參 一兩去蘆 陳橘皮 一兩湯浸去白穰焙 甘草 半兩炙微赤剉

白朮 一兩 高良薑 半兩剉 桂心 半兩

右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

五噎附論

夫五噎者氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸脇苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣上膈脇下支滿胸中填塞令手足逆冷不能自温食噎者食無多少惟胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮此皆憂恚嗔怒寒氣上入胸脇所致也　陰陽不和則三焦隔絶而津液不利致令氣塞不調理也是以成噎皆由憂恚所致憂恚則氣結而不宣流使噎噎者噎塞不通也

食噎者此由臟冷而不理津液澁少而不能傳行飲食故食入則噎塞不通謂之食噎胸内痛不得喘息飲食不下是也

昆布丸出聖惠方 治五噎咽喉妨塞食飲不下宜服

昆布一兩半洗去鹹味 羚羊角屑半兩 麥門冬一兩半去心焙

柴胡三分去苗 木通一兩剉 天門冬一兩半去心焙 檳榔三分 百合一兩 訶梨勒皮一兩半 川大黄一兩剉碎微炒

郁李仁一兩湯洗去皮微炒 射干半兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒

川朴硝一兩　紫蘇子半兩微炒　陳橘皮三分湯浸去白

桂心一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時候以熱酒下三十丸夜飯後取一丸如彈子大綿褁

含化嚥津

五噎散出仁存方　治五噎食不下嘔噦痰多咽喉噎塞胸背滿痛

人參　半夏湯泡七次　桔梗去蘆剉炒　白豆蔻　白朮

木香不見火　杵頭糠　蓽澄茄　沉香不見火

枇杷葉拭去毛　乾生薑各一兩　甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一中盞生薑七片煎至六分

食後溫服

人參丸出千金方　治五種之氣皆令人噎名五噎心胸氣

塞三焦隔絶咽喉不利食飲難下

人參　半夏　桂心　防風一作防葵　小草　附子

細辛　甘草各二兩　紫苑　乾薑　茱萸係食茱萸

芍藥 烏頭各六分 枳實一兩

右為末蜜丸如梧桐子大酒服五丸三日不知加至十五丸烏頭與半夏相反當去一味合一方有訶梨勒皮一兩和丸以生薑湯下二十丸

人參散出聖惠方 治五噎胃脘氣滞心胸滿悶咽中噎塞不能下食

人參半兩去蘆頭 半夏半兩湯泡七次 桂心半兩 白朮半兩

乾薑炮製剉半兩 草豆蔻一兩去皮 甘草半兩炙微赤剉

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　枇杷葉半兩拭去毛炙　蓽撥半兩

厚朴一兩去粗皮薑汁炙令香　大腹皮剉一兩　訶梨勒皮半兩

丁香半兩

右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

乾薑丸出聖惠方 治五噎咽喉壅塞不通胸膈憂恚氣滯胃寒食少

乾薑半兩炮製剉　川椒半兩去目閉口者微炒　食茱萸半兩

羚羊角屑一兩　射干一兩　馬蘭子一兩微炒　桂心一兩

人參一兩去蘆　細辛一兩　白朮一兩　附子一兩炮製去皮臍

赤茯苓一兩　訶梨勒皮一兩　陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時

候薑湯下三十丸

半夏散出聖惠方　治五噎

半夏半兩湯泡七次　蘆根一兩剉　甜葶藶半兩隔紙炒令紫色

右件藥擣為散以水二大盞半入生薑半兩同煎至

一盞半去滓不計時候溫分三服

治五噎胸膈咽喉不利痰逆食少

右半夏七枚小者湯洗去滑為細散一錢以濃薑湯

調服

五噎丸一方食茱萸丸 治胸中久寒嘔逆及食飲不下結氣

不消方出千金方

乾薑 蜀椒 食茱萸 桂心 人參各五分

細辛 白朮 茯苓 附子各四分 橘皮六分

右為末蜜和丸如梧桐子大以酒服三丸日三不知稍加至十丸一方米飲下忌酢物生冷桃李雀肉猪肉冷水生葱等

半夏散出聖惠方 治五噎心胸不利痰壅食少

半夏一兩湯泡七遍 檳榔二兩 前胡一兩去蘆頭 桂心一兩

枳殼一兩麸炒 吴茱萸半兩湯浸 人參一兩去蘆 甘草半兩炙

桔梗一兩去蘆

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分小麥小

豆各五十粒煎至六分去滓不計時候稍熱服

木香散出聖惠方 治五膈噎食少四肢乏力

木香半兩 人參半兩去蘆 赤茯苓三分 神麯三分炒微黄

麥蘖三分炒微黄 桃仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黄 肉豆蔻半兩

青橘皮三分湯浸去白焙去殻 甘草一分炙微赤剉

右為細散每服一錢以水一小盞煎至五分和滓不計時候稍熱服

硫黄丸出聖惠方 治五噎心胸咽喉廹塞痰毒壅滞湯嗌

稠粘不能下食宜服此吐之

硫黄一分細研　麝香一錢細研　阿魏一分麵裹煨　安息香一分

砒霜一錢細研　硃砂一分細研　乳香一分去油細研入

蜜陀僧一分細研

右件藥同研令勻細鎔乳香安息香及煉了蜜少許和丸如菉豆大每服不計時候以冷香茶下五丸當吐如人行十里未吐再服

膈氣丸出十便良方　治氣食憂勞思慮五噎膈氣

半夏麴　桔梗各三兩　肉桂　枳殼各一兩半

右為細末薑汁糊丸如梧桐子大薑湯下三十丸食後臨卧服

治五噎立効方出聖惠方

枇杷葉一兩拭去毛炙微黄　陳橘皮一兩湯浸去白焙　生薑半兩

右件藥都以水二大盞半煎至一盞半去滓不計時候分温三服

五噎散出三因方　治五種噎食飲不下胸背痛嘔噦不徹

攻刺疼痛淚與涎俱出

人參　茯苓　厚朴去皮剉薑汁製炒　枳殼麩炒去白穰

桂心　甘草　訶子炮去核　白术　橘皮去白穰焙

白薑炮　三稜炮　神麯炒　麥蘖各炒二兩

木香煨　蓬术各炮半兩　檳榔半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至七分空心温服鹽湯點亦得

竹皮湯出千金方　治噎聲不出

竹皮一用竹葉 細辛 甘草 生薑 通草 人參

茯苓 麻黃 五味子 桂心各一兩

右㕮咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下藥取三

升分三服

開胃生薑丸出宣明論 治中焦不和胃口氣塞水穀不化

噎氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹噦逆惡心

嘔吐痰水宿食不消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進美

飲食

生薑一斤切成片子鹽三兩淹一宿 桂心一兩 青皮去白穰炒微黄

陳皮去白穰焙 甘草炙各二兩 砂仁四十九枚 廣茂

當歸各五錢

右為末蜜丸如梧桐子大每服一丸食前細嚼沸湯

下

治卒乾噎不息亦治吐逆乾嘔

右取甘蔗汁温冷熱服半升日三又生薑汁半升服

差

升麻散　療因食即噎塞如炙肉臠在咽中不下

升麻四分　桔梗四分　木通十二分　吴射干四分

赤茯苓　百合各八分　紫菀頭十二枚

右切以水二大升煎取九合去滓分温三服食後良

久服忌猪肉酢物

漢防已散出濟生拔粹方　治噎

漢防已五錢　官桂一兩　細辛七錢半　陳皮去白一兩

羚羊角末七錢半　紫蘇七錢半　杏仁湯洗去皮尖一兩

右為粗末每服三錢薑三片水煎日進三服

深師療噎方

羚羊角屑 前胡 甘草各一兩 人參

橘皮各二兩

右切以水六升煮取二升分四服忌海藻菘菜

治男子婦人氣噎病出百一選方

雞嗉子兩箇和宿食用濕紙裹黃泥固濟內炭火燒將烟斷時取出去黃泥嗉子內物不可去分毫 木香 丁香 沉香各一錢

右為細末用煮棗去皮核丸如梧桐子大每服三十丸食前下

橘甘湯 治咽喉噎塞堵悶咳咯膿血

桔梗二兩 甘草炙 橘皮 半夏薑製各一兩

右為粗末每服三錢水二小盞生薑七片同煎一盞去滓不拘時候温服

治卒噎出經驗良方

青皮炒 土烏藥 淨茴香炒 木瓜各等分

右㕮咀同煎至七分去滓温服

治噎出百一選方

右以蘿蔔濃煎湯如熱水飲之

治卒失聲音塞噎不出

右以苦竹葉汁飲之

療噎方

右取頭垢如棗大以粥若漿水服之

必効主噎方

以鐵捺大椎盡力則下仍令坐之

又方 出十便方

右以酢煮麵糊啜之則差只可一兩日差欲長久絶者取溲為丸如彈子大于酢中煮令熟于中澤却及熱食二十九不過三兩度差

治諸噎 出千金方

右如常食乾粳米飯即不噎

又方 出千金方

末火炭蜜丸如彈實大含少少咽津

又方 出千金方

用老牛涎棗核大水中飲之終身不復噎一方用黃犍牛涎沫

噎病飲食不通

右用狐狸腦骨炒為末服之又以酸漿水調頭垢煎湯食之立止

治噎食

用猢猻糞隂乾燒灰好酒送下不過十服立差

治噎病出聖惠方

右用豺皮狼喉結曝乾杵末入半盞飯内食之効

一方無豺皮

治噎方

用白鵝尾燒灰酒服

治噎方欲發時出聖惠方

右銜鸕鷀嘴遂下

治噎塞出聖惠方

右羚羊角屑為末不以多少米飲服之一方即以角

摩噎上良

噎塞不通方

右營實根擣為散酒下方寸匕日三服

治卒噎出千金方

右滿口着蜜食之即下

又方出千金方

右捻取飯盆邉零飯一粒食之即下

又方出千金方

右用楓子炒烟微起即為末乾柿蔕煎湯下

治卒食噎出聖惠方

右用陳橘皮一兩去瓤焙為末用水一大盞煎至半盞熱服

半夏湯　治主噎亦治飲食輒噎

生薑四兩　半夏一升洗　石膏四兩碎　小麥

吴茱萸一升 赤小豆二十顆 大棗二十一顆 人參

甘草 桔梗一作括蔞根 桂心各二兩

右切以酒二升水八升煮取三升分三服忌猪羊肉

海藻菘菜餳生葱等

大腹皮丸 治胸膈氣噎塞煩悶不下飲食腹脇妨脹

秘澁不通

大腹皮一兩剉 木香一兩 訶梨勒皮一兩 桂心半兩

川大黄一兩半剉碎微炒 半夏湯泡七次 枳殼一兩麩炒微黄去穰

芎藭三分 青橘皮一兩湯浸去白穰焙 乾木瓜一兩 前胡一兩去蘆 郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候煎生薑木通湯下三十丸

治氣噎不通不得食方

杏仁 桂心各三分

右為末蜜丸如棗大稍稍咽之臨食先含彌佳

半夏散 治氣噎不通心悸喘急胸背疼悶咽喉壅塞

半夏湯泡七次 柴胡一兩去苗 羚羊角屑一兩 射干三分

木香半兩 赤茯苓一兩 桔梗三分去蘆 昆布一兩洗去醎味

甘草半兩炙微赤剉

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

羚羊角湯 治氣噎不通不得食

羚羊角 通草 橘皮各二兩 吴茱萸 厚朴

乾薑各三兩 烏頭五枚

右㕮咀以水九升煮取三升分三服日三

桂心散　治氣噎極甚咽喉胸膈壅塞不通

桂心一兩　吴茱萸半兩湯浸七遍焙　射干一兩　木香半兩

赤茯苓一兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

通氣湯　治胸滿氣噎

半夏八兩　生薑六兩　桂心三兩　大棗三十枚

右㕮咀以水八升煮取三升分五服日三夜二

通氣噎湯方

半夏三兩洗　生薑八兩　桂心三兩　羚羊角三兩

右切以水八升煮取三升分服半升日再服忌羊肉生葱餳

治氣噎不下飲食

枇杷葉去毛炙　青皮　陳皮並去穰

右等分為末每服二錢水一盞生薑五片同煎至七

分温服不拘時候

療氣噎煎方

蜜　酥　薑汁各一升

右合和微火煎五六沸取如大棗二枚内酒中飲之

亦可一方以慢火煎成膏收甆合每取半棗大含化嚥津妙

赤茯苓散　治氣噎心膈壅滯不能下食宜服此方

赤茯苓一兩　桂心半兩　桑根白皮一兩

右為散每服三錢以水一中盞入粟米一茶匙煎至六分去滓不拘時候温服

半夏散　治咽喉不利胸膈氣噎不下飲食

半夏一兩湯洗七次　桂心三分　木香半兩

右為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

救急療喉中氣噎方

半夏洗　柴胡　生薑各三兩　羚羊屑三兩　桔梗

犀角屑 昆布 通草 甘草炙各二兩

右切以水八升煮取三升分三服忌羊肉餳猪肉海藻菘菜等物

檳榔散 治氣噎食飲不下腹中雷鳴大便不通利氣

檳榔二兩 木香半兩 芎藭半兩 訶梨勒皮一兩 昆布一兩洗去醎味 桂心半兩 甘草一分炙微赤剉 川大黃一兩剉碎微炒 半夏半兩湯洗七次

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候稍熱服

治胸中氣噎不下食喉中如有肉塊方

昆布（二兩洗去鹹味） 小麥（二合）

右件藥以水三大盞煎候小麥爛熟去滓每服不計時候喫一小盞仍揀取昆布不住含三兩片子嚥津極妙

治噫不下食（出肘後方）

右取崖蜜含微微嚥下

半夏湯出千金方　治氣噎不食兼嘔吐此病由藏氣冷而不理津液澁少而不能傳行飲食故食入則噎塞而不通謂之食噎胸内痛不得喘息食不下者食噎也亦治噦欲死者

半夏四兩洗　生薑三兩各切

右以東流水二大升煎取一升去滓温服三合日三

忌羊肉餳

半夏散一名乾薑湯出千金方　治飲食喜噎宜服

半夏一兩湯洗七次　乾薑一兩炮製剉　石膏二兩　桂心一兩
人參一兩去蘆　菰𦿐根一兩　甘草半兩炙微赤剉　吴茱萸半兩湯浸七次焙
右為細散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚小麥小豆各五十粒同煎至六分去滓不計時候稍熱服之
羚羊角散出聖惠方　治食噎飲食不下妨悶極甚
羚羊角屑一兩　前胡一兩去蘆　甘草一兩炙微赤剉　人參

二兩去蘆 赤茯苓一兩 陳橘皮二兩湯浸去白焙 馬蘭子二兩微炒

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣食噎方出聖惠方

川大黃一兩剉碎微炒 訶梨勒皮一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十九

治胸膈氣滯食噎不下方出千金方

右以手巾布裹舂杵頭糠時時拭齒治卒噎刮舂杵頭細糠含之煎湯呷亦得

治卒食噎方出聖惠方

右爲鷄毛燒灰五兩滑石末三兩相和令匀不拘時候煎榆白皮湯調下一錢

撞氣阿魏丸出和濟方 治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸

水丈夫小腸氣婦人血氣攻刺等疾

茴香炒　青皮去白穰炒　甘草炒　蓬莪朮炮一方用蒼朮

川芎　陳皮去白各一兩　白芷半兩　丁香皮炮半兩

縮砂仁　肉桂去皮各半兩　生薑四兩切作片子鹽淹半日

胡椒　阿魏醋浸一宿以白麵為糊各二錢半

右用為末用阿魏和丸如雞頭子大每藥九一斤用硃砂七錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下一粒至二粒婦人血氣醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下一方丈

夫氣痛炒茴香湯下

神麯丸 出指南方 治食噎

神麯一兩 陳橘皮二兩

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服一粒含化

嘉禾散 出指南方 治氣噎

沉香 丁香 藿香葉 訶子去核 大腹子炒

橘皮 杜仲去皮杵薑汁酒拌一宿 白朮炒各二兩 縮砂

人參 茯苓 薏苡仁 枇杷葉去毛薑汁炙各一兩

甘草一兩半炙　石斛去根酒炒三兩　穀糵炒半兩　半夏麹

神麹各一分　五味子炒半兩

右為細末每服五錢水二盞乾柿半箇切同煎一盞

細呷之

調氣丸出指南方　治氣噎

牽牛麵四兩　陳橘皮一兩　青橘皮二兩　木香二兩

右為末研勻水丸如梧桐子大每服十粒生薑橘皮

湯下

小七香丸出衛生家寶方能温中快膈治食噎飲食不下冷疾翻胃腹脹脾冷遠年茶酒食積眼瞼俱黄赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣

益智仁六兩 縮砂仁二兩 廣茂炮二兩 丁香十二兩

香附子炒去毛十二兩 甘草十二兩炙 甘松去土八兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服二丸温酒薑湯下或氣脹滿磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭眩惡心胸膈滿悶者先嚼二十丸後呑三丸生薑紫

蘇湯下此藥性温下不動臟腑

通氣湯出御藥院方　主胸滿氣噎

半夏湯洗八兩　生薑六錢　大棗二錢去核　吴茱萸半錢炒黄

桂三錢去皮

右五味㕮咀每服五錢水一大盞生薑十片棗一枚

煎至五分温服不計時候

治熱噎胸前噎塞不通飲食不下出護命方

所有湯水飲食只到喉中便吐出所嚥者津液只到

喉中亦便吐出口膠非時睡中涎溢大腑秘熱出後不快先用葱湯洗穀道兩三四次後用此方通引大腑氣令得通順出後寛快然後喫後方藥以効為度為臟腑虛實不定令有四方藥在後請酌量臟腑進服

治風噎病出護命方

牽牛子二兩半　皂角一兩去黑皮炙乾

右各細杵羅為末每使三錢用舊筆管盛藥内在穀

道中吹之取大腑氣下乾糞通暢筆管須是石上磨無鋒刄免傷腸胃

治噎病如前方　所説病根用引大腑藥了大腑通快宜服此方

沉香　木香各二錢　羗活　防風　川芎　薄荷　枇杷葉新布拭去毛炙　牽牛熟使　荆芥穗各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞生薑一片同煎一二沸食後去滓服

治噎病如前方　所說病根用前方引大腑藥已得通暢血脈盛者即喫此方

枇杷葉半兩拭去毛　甘草　沉香各三銖　紫蘇葉　荆芥穗

右細杵羅為末每服以生薑一大片煎藥水二盞取九分食後或半空心服

治噎塞不通　因憂悲而得大腑不通宜先用引大腑藥了後喫此方須是大腑通喫此藥

桑寄生 防風 枇杷葉 甘草 桔梗 沉香

木香 川芎各一分 細辛四銖 牽牛熟使半兩

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心服

漸減分數即減牽牛一味

治冷噎不通飲食不進 身上厥冷胸前如有冷物一

塊填塞心胸大腑虛冷宜進此服

藿香 細辛 菖蒲 半夏 甘草各一分 乾薑

豆蔻 吴茱萸 蓬莪茂 川芎各一兩 煎香半兩

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分生薑三片同

煎取一盞一分空心和滓去滓任意服

治胃寒癥濕四肢厥冷胸前噎塞飲食不下腹脇脹滿

大腑虛冷

草豆蔻半兩 防風去蘆 細辛 肉豆蔻 木香

藿香 川芎各一分 官桂去皮 丁香各三銖

右細剉羅為末每服二錢水一盞煎一二沸和滓空

心喫之

東坡先生家藏五行記云出肘後方

絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胸喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子置器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍多作靛有一僧以靛置器中此蟲遂遶器中走須臾化為水故世稱藍靛治噎有効一方治膈氣咽喉噎塞飲食不下

主噎哽心胸痛滿出本草

用屐屧鼻繩灰着經久遠欲爛斷者水服之良

治食哽出本草


右鷹屎燒灰服方寸匕虎狼鵰屎亦得

療卒噎法出聖惠方

右傍人可緩解衣帶令噎者知則愈

治卒噎方

右方與共食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當答言筋共食人云噎下去則立愈



治卒噎不下方

水一杯　刀一口

右先以刀橫水已後盡飲之則下

噎不下食煩悶

夫陰陽不和則三焦隔絶而津液不利遂令氣不調是以成噎也此由憂恚所致憂恚則氣結氣結則不宣流食飲不下心胸煩悶故令噎塞不通也

方

木香散出聖惠方 治心胸噎塞煩悶食飲不下

木香半兩 赤茯苓半兩 昆布三分洗去鹹味 桔梗三分去蘆

木通三分剉 桑根白皮二兩 半夏三分湯泡七次 射干半兩 人參三分去蘆 枇杷葉三分拭去毛炙黃 桂心三分

枳殼三分麸炒微黃

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候溫服

蘆根散出聖惠方 治噎不下食心胸煩悶不得眠臥

蘆根剉一兩　木通剉半兩　射干三分　半夏湯泡七次三分

赤茯苓半兩　人參去蘆一兩　甘草炙半兩　枳殼麩炒三分

微黄

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

訶梨勒散出聖惠方　治噎心胸煩滿食飲不下脇腹妨悶

訶梨勒皮一兩半　枳殻麩炒三分去瓤　甘草炙半兩微赤剉

桂心三分　陳橘皮湯浸去白焙一兩　蘆根剉一兩　木瓜

乾者三分　木香半兩　羚羊角屑三分

右為細散不計時候煎木瓜湯調下一錢

半夏圓出聖惠方　治噎心胸短氣煩悶不能下食


半夏二兩湯泡七次　木香一兩　羚羊角屑一兩

桂心一兩半　枳殼二兩麸炒微黃去穰

右為細末以生薑自然汁煮麪糊和丸如梧桐子大

每服不計時候煎木瓜湯下二十丸

生薑汁煎出聖惠方　治噎不能下食咽喉壅塞



生薑汁五合　白蜜五兩　人參二兩去蘆擣羅為末

百合二兩擣羅為末　牛酥

右件藥內銅鍋中以慢火煎成膏不計時候含一丸

如半棗大嚥津或煎人參湯調下一茶匙亦得

普濟方卷二百五